


Протокол вакцинации молодняка (вакцины MSD АН)



Линейка вакцин Бовилис® способствует комплексной защите против 9 респираторно-репродуктивных и кишечных заболеваний

BOVILIS	ВД (тип 1,2)	ИРТ	Manheimia haemolytica	РСИ	ПГ-3	Ротавирус, Коронавирус, E.coli
Бовилис® BVD	*					
Бовилис® IBR*		*				
Бовилис® Бовипаст RSP			*	*	*	
Ротавек® Корона						*

Использование¹⁰ Ротавек® Корона и Бовилис® Бовипаст RSP дает синергетический эффект, который выражается в снижении заболеваемости телят НД и пневмонией (до 7 раз)⁹

Бовилис® IBR* интраназально для местного иммунитета в респираторной системе на 4й день после вакцинации.


Бовилис® Бовипаст RSP для системного иммунного ответа с 14 дня¹¹.

*Бовилис® IBR маркированная живая с растворителем Унисолв

** при ревакцинации материнские антитела могут отрицательно влиять на результаты вакцинации

Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.

Протокол вакцинации для телок и нетелей (вакцины MSD AH)




BOVILIS	ВД (тип 1,2)	ИРТ	Manheimia haemolytica	РСИ	ПГ-3	Ротавирус, Коронавирус, E.coli
Бовилис® BVD	*					
Бовилис® IBR*		*				
Бовилис® Бовипаст RSP			*	*	*	
Ротавек® Корона						*

Бовилис® BVD обеспечивает иммунитет, достаточный для защиты плода в течение 6 месяцев после первичной вакцинации и 12 месяцев после 3 дозы (бустерной вакцинации)

При первичной вакцинации, вторую дозу **Бовилис® BVD** можно отложить на срок до 6 месяцев после первой дозы²¹

При ревакцинации **Бовилис® IBR** и **Бовилис® BVD** можно применять совместно, используя **Бовилис® BVD** в качестве растворителя.

Протокол вакцинации КРС переход с вакцины ВИСТА на вакцины БОВИЛИС (вакцины MSD AH)



BOVILIS	ВД (тип 1,2)	ИРТ	Manheimia haemolytica	РСИ	ПГ-3	Ротавирус, Коронавирус, E.coli
Бовилис® BVD	*					
Бовилис® IBR*		*				
Бовилис® Бовипаст RSP			*	*	*	
Ротавек® Корона						*

Первично вакцинируем двукратно **Бовилис® BVD**, вторую дозу можно отложить на срок до 6 месяцев после первой дозы²¹


Ревакцинация **Бовилис® BVD** и **Бовилис® IBR*** проводится однократно**

Ротавек® Корона и **Бовилис® Бовипаст RSP** применяется однократно за 3-12 недель до отёла.

*Бовилис® IBR маркированная живая с растворителем Унисолв

** согласно пункту 15 инструкции по применению


Протокол вакцинации против пневмонии исходя из критического периода



BOVILIS	ИРТ	Manheimia haemolytica	РСИ	ПГ-3
Бовилис® IBR*	*			
Бовилис® Бовипаст RSP		*	*	*

Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.

ПРОГРАММА ЛИКВИДАЦИИ ВД и ИРТ (вакцины MSD АН)



ЛИКВИДАЦИЯ ВД и ИРТ:

Преимущества:

- Оздоровление поголовья от вирусов ВД и ИРТ
- Вакцинация вне зависимости от стельности (в том числе первично)
- Совместное применение (в одном флаконе) при ревакцинации
- **Бовилис® BVD** — защита эмбриона и профилактика рождения постоянно инфицированных (PI) ВД телят²⁰
- Широкий перекрестный иммунитет от разных штаммов ВД (BVDV)³¹
- **Бовилис® IBR*** — контроль ликвидации ринотрахеита за счет маркированного вакцинного штамма ИРТ, что позволяет дифференцировать больных животных от вакцинированных.

*Бовилис® IBR маркированная живая с растворителем Унисолв

31. Patel, J.R., Didlick, S., Quinton, J. Variation in immunogenicity of ruminant pestiviruses as determined by the neutralization assay. The Veterinary Journal (2005) 169:468-472

Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.